

Síndrome metabólica e disfunção ventricular esquerda subclínica

Metabolic syndrome and subclinical left ventricular dysfunction

Wilson Cañon Montañez^{1,2} ✉

¹ Faculdade de Ciências da Saúde, Universidad de Santander (UDES), Bucaramanga, Colômbia.

² Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brasil.

RESUMO

Estudos recentes usando ecocardiografia convencional e doppler tecidual têm mostrado evidência de disfunção miocárdica em indivíduos com síndrome metabólica. Recentemente, a ecocardiografia bidimensional *speckle-tracking* (2D-STE) emergiu como uma técnica robusta para detectar disfunção ventricular esquerda subclínica por avaliação quantitativa da deformação do miocárdio. Alguns estudos sugerem que a síndrome metabólica está associada com a deformação longitudinal do ventrículo esquerdo e, que o *strain* longitudinal global medido pela 2D-STE está prejudicado em sujeitos com síndrome metabólica. Pode-se inferir que a identificação precoce da disfunção ventricular esquerda e o reconhecimento do papel dos componentes da síndrome metabólica na alteração da contratilidade miocárdica ajudarão na compreensão e predição de risco de doenças cardiovasculares nessa síndrome.

DESCRITORES: síndrome X metabólica; função ventricular esquerda; contração miocárdica; ecocardiografia.

ABSTRACT

Recent studies using both conventional and tissue Doppler echocardiography have gathered evidence of myocardial dysfunction in individuals with metabolic syndrome. Recently, two-dimensional speckle-tracking echocardiography (2D-STE) has become a robust method for the detection of subclinical left ventricular dysfunction through quantitative assessment of myocardial deformation. Some studies suggest that metabolic syndrome is associated with longitudinal deformation of the left ventricle and that global longitudinal strain measured by 2D-STE is impaired in individuals with metabolic syndrome. It may be inferred that the early identification of subclinical left ventricular dysfunction and the determination of the role of the components of metabolic syndrome in impaired myocardial contractility can help elucidate and predict the risk of cardiovascular diseases in this syndrome.

KEY WORDS: metabolic syndrome X; ventricular function, left; myocardial contraction; echocardiography.

Recebido: outubro, 2016

Aceito: outubro, 2016

Publicado: outubro, 2016

✉ Correspondência: wcanon@udes.edu.co



Este artigo está licenciado sob forma de uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional, que permite uso irrestrito, distribuição e reprodução em qualquer meio, desde que a publicação original seja corretamente citada. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR

Abreviaturas: DCV, doenças cardiovasculares; DVE, disfunção ventricular esquerda; IC, insuficiência cardíaca; SM, síndrome metabólica; 2D-STE, ecocardiografia bidimensional *speckle-tracking*.

As doenças crônicas não transmissíveis, principalmente doenças cardiovasculares (DCV), diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas, são as principais causas de morte no mundo e constituem um problema de saúde pública global. As transições demográfica e epidemiológica que caracterizaram as mudanças de perfis de saúde-doença globalmente no século passado, embora em ritmos distintos, foram acompanhadas também de uma transição nutricional, em que as deficiências nutricionais foram "substituídas" pelo excesso de peso. Nesse cenário, emergem novos problemas de saúde pública como a obesidade e a síndrome metabólica (SM) [1].

A SM é caracterizada como um conjunto de fatores de risco cardiovasculares, incluindo obesidade abdominal, intolerância à glicose, resistência à insulina, dislipidemia e hipertensão [2]. Estima-se que aproximadamente 25% da população adulta do mundo tenha SM e esta condição está associada ao incremento do risco de desenvolver diabetes, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral [3].

Na última década alguns estudos têm mostrado que o excesso de peso, obesidade, SM e a diabetes desempenham um papel importante no desenvolvimento de morbidade e mortalidade cardiovascular [4]. Estudos clínicos indicam que a SM não só está ligada ao desenvolvimento de fatores de risco para doença vascular aterosclerótica, mas também é associada com outro desfecho cardiovascular como insuficiência cardíaca (IC) [5].

A IC é uma síndrome clínica complexa que resulta de qualquer alteração estrutural ou funcional de enchimento ventricular ou ejeção de sangue [6]. A síndrome de IC tem sido comparada com um iceberg. A seção visível representa casos de IC estabelecidos na comunidade: a maioria no contexto da atenção primária. A parte não visível "abaixo do nível da água" representa casos de IC não detectada, e aqueles com disfunção ventricular esquerda (DVE) assintomática ou subclínica considerados propensos a desenvolver IC.

Em relação a ferramentas diagnósticas para a IC, a ecodopplercardiografia é um método rápido e útil na confirmação diagnóstica, avaliação da etiologia, do modelo fisiopatológico e hemodinâmico, do prognóstico e para indicar possíveis alternativas terapêuticas. O parâmetro mais importante para quantificação da função sistólica é a fração de ejeção do ventrículo esquerdo.

Estudos recentes usando ecocardiografia convencional e doppler tecidual têm mostrado evidência de disfunção miocárdica em indivíduos com SM [7]. No entanto, os parâmetros ecocardiográficos convencionais para aferição da função sistólica apresentam baixa sensibilidade para a avaliação minuciosa da contratilidade miocárdica e não detectam pequenas mudanças da contratilidade ou alterações precoces.

Recentemente, a ecocardiografia bidimensional *speckle-tracking* (2D-STE) emergiu como uma técnica mais robusta para detectar DVE subclínica por avaliação quantitativa da deformação do miocárdio [8,9]. Um dos conceitos chave da metodologia *speckle-tracking* é o *strain*, expresso em porcentagem (%) e definido como a mudança fracional no comprimento de um segmento do miocárdio, normalmente relacionado ao comprimento na diástole final. O *strain* pode ser avaliado em cada região do ventrículo estudado (*strain* regional) e a média destes valores passam a representar o *strain* global, refletindo a função ventricular global. Com essa metodologia, é possível avaliar as fibras miocárdicas em seus eixos de orientação específicos (fibras subendocárdicas e *strain* longitudinal, e fibras subepicárdicas e *strain* circunferencial e radial) [10].

Alguns estudos prévios em amostras pequenas sugerem que a SM está associada com a deformação longitudinal do ventrículo esquerdo e, que o *strain* longitudinal global medido pela 2D-STE está prejudicado em sujeitos com SM [10]. No entanto, esta associação ainda está por ser demonstrada em grandes amostras representativas.

A partir dessas evidências pode-se inferir que a identificação precoce da DVE subclínica na SM e o reconhecimento do papel dos componentes desta síndrome na alteração da contratilidade miocárdica ajudarão na compreensão e predição de risco de DCV na SM.

REFERÊNCIAS

1. Cañon-Montañez W. Strain longitudinal global e síndrome metabólica no ELSA-Brasil: uma análise por ecocardiografia bidimensional speckle-tracking. Porto Alegre. Tese [Doutorado em Epidemiologia] - Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2016. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/139778>
2. Grundy SM. Metabolic syndrome: a multiplex cardiovascular risk factor. *J Clin Endocrinol Metab.* 2007;92(2):399-404. <http://dx.doi.org/10.1210/jc.2006-0513>
3. Mottillo S, Filion KB, Genest J, Joseph L, Pilote L, Poirier P, Rinfret S, Schiffrin EL, Eisenberg MJ. The metabolic syndrome and cardiovascular risk a systematic review and meta-analysis. *J Am Coll Cardiol.* 2010;56(14):1113-32. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2010.05.034>
4. Mensah GA, Mokdad AH, Ford E, Narayan KM, Giles WH, Vinicor F, Deedwania PC. Obesity, metabolic syndrome, and type 2 diabetes: emerging epidemics and their cardiovascular implications. *Cardiol Clin.* 2004;22(4):485-504. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ccl.2004.06.005>
5. Suzuki T, Katz R, Jenny NS, Zakai NA, LeWinter MM, Barzilay JI, Cushman M. Metabolic syndrome, inflammation, and incident heart failure in the elderly: the cardiovascular health study. *Circ Heart Fail.* 2008;1(4):242-8. <http://dx.doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.108.785485>
6. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, Butler J, Casey DE Jr, Drazner MH, Fonarow GC, Geraci SA, Horwich T, Januzzi JL, Johnson MR, Kasper EK, Levy WC, Masoudi FA, McBride PE, McMurray JJ, Mitchell JE, Peterson PN, Riegel B, Sam F, Stevenson LW, Tang WH, Tsai EJ, Wilkoff BL. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol.* 2013;62(16):e147-239. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2013.05.019>
7. Gong HP, Tan HW, Fang NN, Song T, Li SH, Zhong M, Zhang W, Zhang Y. Impaired left ventricular systolic and diastolic function in patients with metabolic syndrome as assessed by strain and strain rate imaging. *Diabetes Res Clin Pract.* 2009;83(3):300-7. <http://dx.doi.org/10.1016/j.diabres.2008.10.018>
8. Shah AM, Solomon SD. Myocardial deformation imaging: current status and future directions. *Circulation.* 2012;125(2):e244-8. <http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.111.086348>
9. Voigt JU, Pedrizzetti G, Lysyansky P, Marwick TH, Houle H, Baumann R, Pedri S, Ito Y, Abe Y, Metz S, Song JH, Hamilton J, Sengupta PP, Kolias TJ, d'Hooge J, Aurigemma GP, Thomas JD, Badano LP. Definitions for a common standard for 2D speckle tracking echocardiography: consensus document of the EACVI/ASE/Industry Task Force to standardize deformation imaging. *J Am Soc Echocardiogr.* 2015;28(2):183-93. <http://dx.doi.org/10.1016/j.echo.2014.11.003>
10. Cañon-Montañez W, Santos ABS, Foppa M. Strain longitudinal global: un parámetro útil para evaluar disfunción ventricular izquierda subclínica en el síndrome metabólico. *Rev Colomb Cardiol.* 2016;23(2):112-9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.rccar.2015.10.008> 