ZOOLOGIA

DESCRIÇÃO DO MACHO DE Huachia trilobata (HEMIPTERA, CICADELLIDAE)¹

Keti Maria Rocha Zanol²

RESUMO

O macho de *Huachia trilobata* Linnavuori & DeLong, 1978 é descrito e ilustrado. **Palavras-chave:** Athysanini, Deltocephalinae, *Huachia trilobata*, macho.

ABSTRACT

Description of the male of *Huachia trilobata* (Hemiptera: Cicadellidae).

The male of *Huachia trilobata* Linnavuori & DeLong, 1978 is described and illustated.

Key words: Athysanini, Deltocephalinae, Huachia trilobata, male.

Linnavuori & DeLong (1978) descreveram *Huachia tribolata* com base num espécimen fêmea oriunda de Piracicaba, São Paulo. No presente trabalho se descreve o macho de *H. trilobata*, até então desconhecido.

O material estudado pertence à Coleção de Entomologia Pe J. S. Moure, Departamento de Zoologia, da Universidade Federal do Paraná.

Huachia trilobata Linnavuori & DeLong, 1978

(Figs. 1-7)

Macho. Externamente semelhante à fêmea porém mais escuro. Coroa amarelada; margem anterior com duas manchas marrom-escuras; região discal com manchas, de contornos irregulares, marrons. Face marrom com uma faixa transversa, entre os ocelos e arcos laterais amarelados. Pronoto marrom com áreas arredondadas amarelas; margem anterior amarelada. Asas anteriores semitransparentes e marrons; células com manchas alongadas marrom-escuras; margem costal com áreas amarelas; venação marrom.

Cabeça: coroa de comprimento uniforme; superficie densamente microesculturada; sutura coronal atingindo a metade do comprimento da coroa; ocelos na margem anterior, não visíveis de cima; distância ocelo-

ocular menor que o diâmetro do ocelo. Sutura frontoclipeal estendendo-se até os ocelos. Anteclípeo levemente mais largo no ápice. Genas com reentrância abaixo dos olhos.

Pronoto tão largo quanto a cabeça; superfície transversamente rugosa. Asas anteriores com duas células anteapicais fechadas; clavo com uma veia extranumerária entre 1A e a sutura claval e outra entre as veias anais. Espinulação das tíbias anteriores 1+4 e dos fêmures posteriores 2+2+1.

Pigóforo com ápice arredondado; lobos laterais com um processo triangular, no terço apical. Valva genital retangular. Placas subgenitais triangulares; macrocerdas unisseriadas. Estilos digitiformes. Edeago simétrico curvo para cima, ápice truncado, sem apêndices.

Fêmea. Sétimo esterno com os ângulos látero-posteriores proeminentes e arredondados; margem posterior projetada num lobo mediano.

Comprimento total (em mm). Macho: 5,6; Fêmea: 5,7-6,0.

Material examinado. Holótipo ♀ do BRASIL: São Paulo, Piracicaba, XII.16.65, col. C. A. Triplehorn; Holotype *Huachia trilobata* Linnavuori+DeL.; Minas Gerais, Pirapora, XI.1975, M. Alvarenga *leg.*, 3 ♂, 2 ♀; Mato Grosso, Nova Xavantina, 23.VI.97, R. Barrera *leg.*, 1 ♀.

Recebido em: 22.09.2005; aceito em: 04.01.2006.

¹ Contribuição nº 1599 do Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Paraná.

² Departamento de Zoologia, UFPR, Caixa Postal, CEP 19020-990, Curitiba, PR, Brasil. kzanol@ufpr.br.


48 ZANOL, K. M. R.

Huachia Linnavuori, 1959 está composto por duas espécies: H. rigicollis Linnavuori e H. trilobata Linnavuori & DeLong; as espécies são muito parecidas sendo diferenciadas pelos apêndices apicais do pigóforo observado em H. rugicollis e, ausente em H. trilobata, pela margem posterior do sétimo esterno que em H. rugicollis apresenta uma fenda mediana enquanto que em H. trilobata é projetada num lobo mediano.

REFERÊNCIAS

LINNAVUORI, R. Revision of the Neotropical Deltocephalinae and some related subfamilies. **Annales Zoologici Societatis Botanicae Fennicae Vanamo**, Helsinki, v. 20, n. 1, p. 1-370, 1959.

LINNAVUORI, R.; DELONG, D. M. Seventeen new species and three new genera of central and South American Deltocephalini (Homoptera: Cicadellidae). **Brenesia**, San Jose, n. 14/15, p. 195-226, 1978.



Figs. 1-7. *Huachia trilobata* Linnavuori & DeLong. **1.** cabeça e pronoto; **2.** edeago, lateral; **3.** pigóforo, lateral; **4.** ápice do pigóforo, ventral; **5.** valva genital, placa subgenital e estilo; **6.** asa anterior; **7.** sétimo esterno da fêmea.